

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
13.10.09 № 738
Реєстраційне посвідчення
№ UA/2053/01/01

I H С T R U K C I Я
для медичного застосування препарату

**ЕНГІСТОЛ
(ENGYSTOL)**

Склад:

діючі речовини: 1,1 мл містить Vincetoxicum hirundinaria D6 – 6,6 мкл, Vincetoxicum hirundinaria D10 – 6,6 мкл, Vincetoxicum hirundinaria D30 – 6,6 мкл, Sulfur D4 – 3,3 мкл, Sulfur D10 – 3,3 мкл;
допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Клінічні характеристики.

Показання.

Гострі та хронічні інфекційні захворювання вірусного походження (гепатит, цитомегаловірусна інфекція, герпес, бронхіт, пневмонія, коклюш, грип, ГРВІ); нейродерміт, екзема, ендокардит, міокардит, захворювання нирок, ревматичні захворювання.

Протипоказання.

Підвищена чутливість до будь-якого компонента препарату.

Спосіб застосування та дози.

Разова доза: дорослим і дітям віком від 6 років – 1 ампула по 1,1 мл.

Застосовувати 1-3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних (в акупунктурні точки), внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій або перорально (розчинити разову дозу в 50 мл води та випити протягом доби, затримуючи на кілька секунд у роті).

У гострих випадках – 1 ампула щоденно протягом 3-5 днів.

Курс лікування: 2-5 тижнів.

Побічні реакції.

У поодиноких випадках можуть виникати висипання на шкірі або свербіж, у такому випадку необхідно припинити застосування препарату і звернутися до лікаря. Також можливі алергічні реакції, ангіоневротичний набряк, зміни в місці введення.

Передозування.

Не відзначалось.

Застосування у період вагітності або годування груддю.

Випадки негативного впливу невідомі.

Діти.

Препарат застосовують для лікування дітей старше 6 років.

Особливості застосування.

Відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.

Невідома.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.

Невідома.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат чинить імунокоригуючу (непряму противірусну), протизапальну, дезінтоксикаційну, регенеруючу SH-групи ферментів при інтоксикаціях дію, яка базується на активації захисних сил організму і нормалізації його функцій.

Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості: прозорий безбарвний розчин без запаху.

Несумісність. Невідома.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання.

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка.

5 ампул та 100 (5x20) ампул по 1,1 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептром.

Виробник.

Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ.

Місцезнаходження.

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Дата останнього перегляду.

Узгоджено з матеріалами реєстраційного досьє та достовірно відомими даними щодо застосування лікарського засобу

Перебудови.

Немає.

Застосування і дози за залежністю від ступеня тяжкості.

Спеціальних вказаний не є.

При

Стрічкою застосовується для нанесення на шкіру в розчині.