

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства охорони  
 здоров'я України  
020412 № Ч72  
Реєстраційне посвідчення  
№ UA/6533/01/01

І Н С Т Р У К Ц І Я  
для медичного застосування препарату

ГЕПАР КОМП. ХЕЕЛЬ  
(HEPAR COMP. HEEL<sup>®</sup>)

**Склад:**

діючі речовини: 2,2 мл розчину містять: Acidum alpha-ketoglutaricum D10 – 22 мг, Acidum fumaricum D10 – 22 мг, Acidum malicum D10 – 22 мг, Acidum oroticum monohydricum D6 – 22 мг, Acidum thiocticum D8 – 22 мг, Avena sativa D6 – 22 мг, Calcium carbonicum Hahnemann D28 – 22 мг, Chelidonium majus D5 – 22 мг, Cinchona pubescens D4 – 22 мг, Colon suis D10 – 22 мг, Cyanocobalaminum D4 – 22 мг, Cynara scolymus D6 – 22 мг, Duodenum suis D10 – 22 мг, Hepar suis D8 – 22 мг, Histaminum D10 – 22 мг, Lycopodium clavatum D4 – 22 мг, Natrium diethyloxalaceticum D10 – 22 мг, Pankreas suis D10 – 22 мг, Silybum marianum D3 – 22 мг, Sulfur D13 – 22 мг, Taraxacum officinale D4 – 22 мг, Thymus suis D10 – 22 мг, Veratrum album D4 – 22 мг, Vesica fellea suis D10 – 22 мг;  
допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

**Лікарська форма.** Розчин для ін'єкцій.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

У комплексному лікуванні дискінезії жовчовивідних шляхів, гострих та хронічних захворювань печінки та жовчовивідних шляхів; порушення діяльності печінки при різних соматичних захворюваннях, а також внаслідок довготривалої дії різних токсичних факторів.

**Протипоказання.**

Підвищена чутливість до рослин родини складноцвітих, у т.ч. до розторопші плямистої, кульбаби лікарської, артишоку посівного або до інших компонентів препарату.

**Спосіб застосування та дози.**

Разова доза: дорослим і дітям від 6 років – 1 ампула по 2,2 мл, новонародженим і дітям до 1 року – 0,4 мл, від 1 до 3 років – 0,6 мл, від 3 до 6 років – 1 мл. Застосовувати 1-3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, а у разі необхідності – внутрішньовенних (струминно) ін'єкцій, а також в акупунктурні точки або перорально. Перорально препарат вживати, розчинивши разову дозу у 5-10 мл води, розчин слід випити, затримуючи на кілька секунд у роті.

При лікуванні дітей вміст ампули набирати в інсуліновий шприц, разову вікову дозу застосовувати у вигляді внутрішньом'язових та підшкірних ін'єкцій або капати у рот, розчинивши у 5 мл води, залишки зберігати у шприці в темному місці при кімнатній температурі та приймати разову вікову дозу перорально у зазначеній термін.

Курс лікування: 3-6 тижнів.

**Побічні реакції.**

У поодиноких випадках можуть виникати реакції гіперчутливості, у тому числі шкірні реакції, крапив'янка, гіперемія шкіри; підвищення температури тіла, неспокій. У таких випадках необхідно звернутися до лікаря.

**Передозування.** Не відзначалося.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Препарат не застосовують у період вагітності або годування груддю у зв'язку з наявністю у складі чистотілу (*Chelidonium*) та чемериці (*Veratrum*).

**Діти.** Препарат застосовують дітям від народження.

**Особливості застосування.**

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого можна змінювати тривалість курсу лікування та спосіб застосування.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Невідома.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Невідома. За призначенням лікаря препарат можна комбінувати з іншими лікарськими засобами та методами лікування.

**Фармакологічні властивості.**

**Фармакодинаміка.** Препарат відновлює дезінтоксикаційну функцію печінки, чинить гепатопротекторну, жовчогінну, регенеруючу, метаболічну, антиоксидантну дію, що базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, що входять до складу препарату.

**Фармацевтичні характеристики.**

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозорий і практично вільний від часток, від безбарвного до злегка рожевого кольору розчин без запаху.

**Несумісність.**

Не слід змішувати з іншими лікарськими засобами в одній ємкості.

**Термін придатності.** 5 років.

**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

5 ампул та 100 (5x20) ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** За рецептром.

**Виробник.**

Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ/  
Biologische Heilmittel Heel GmbH.

**Місцезнаходження.**

Д-р Рекевег-штрасе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина/  
Dr. Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden, Germany.

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
реєстраційного досьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу