

ІНСТРУКЦІЯ  
для медичного застосування препарату

**ОВАРИУМ КОМПОЗИТУМ  
(OVARIUM COMPOSITUM)**

**Склад:**

діючі речовини: 2,2 мл розчину містять: Ovarium suis D8 – 22 мг, Placenta suis D10 – 22 мг, Uterus suis D10 – 22 мг, Tuba uterina suis D10 – 22 мг, Hypophysis suis D13 – 22 мг, Cypripedium calceolus var. pubescens D6 – 22 мг, Lilium lancifolium D4 – 22 мг, Pulsatilla pratensis D18 – 22 мг, Aquilegia vulgaris D4 – 22 мг, Sepia officinalis D10 – 22 мг, Lachesis mutus D10 – 22 мг, Apis D8 – 22 мг, Kreosotum D8 – 22 мг, Calvatia gigantea D6 – 22 мг, Серпхеліс іpecacuanha D6 – 22 мг, Mercurius solubilis Hahnemanni D10 – 22 мг, Hydrastis canadensis D4 – 22 мг, Acidum cis-aconiticum D10 – 22 мг, Magnesium phosphoricum D10 – 22 мг;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

**Лікарська форма.** Розчин для ін'єкцій.

**Фармакотерапевтична група.** Комплексний гомеопатичний препарат.

**Клінічні характеристики.**

**Показання.**

Дисменорея, ендометрит, метрит, параметрит, клімакс, недостатність функції передньої частки гіпофіза (гіpopітутаризм), крауроз вульви, мастопатія, остеомаляція, менорагія, різноманітні порушення метаболізму, пов'язані зі зниженням синтезу жіночих статевих гормонів, включаючи геріатричні.

**Протипоказання.**

Гіперчувствливість до компонентів препарату.

**Спосіб застосування та дози.**

Разова доза: дорослим та дівчатам пубертатного віку – 1 ампула по 2,2 мл. Застосовувати у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньошкірних, а за необхідності – внутрішньовенних ін'єкцій 1-2 рази на тиждень.

З урахуванням особливостей перебігу захворювання та стану хворого лікар може змінювати тривалість курсу лікування та спосіб застосування (пероральний прийом препарату: розчинити разову дозу в 5-10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті, ін'єкції в акупунктурні точки).

Курс лікування – 4-6 тижнів.

**Побічні реакції.**

Алергічні реакції. Можливе посилення слизовиділення, у такому випадку рекомендується зменшити дозу препарату або припинити його застосування.

**Передозування.**

Не відзначалось.

**Застосування у період вагітності або годування груддю.**

Питання про доцільність застосування препарату вагітними та жінками, що годують груддю, вирішується індивідуально з урахуванням співвідношення користь для матері/ризик для плода (дитини).

**Діти.**

Препарат рекомендований для застосування дівчатам пубертатного віку.

**Особливості застосування.**

У поодиноких випадках можливе гомеопатичне початкове загострення захворювання, що швидко проходить і не потребує відміни препарату.

При утримуванні симптомів чи погіршенні стану необхідно проконсультуватися з лікарем.

**Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.**

Не відома.

**Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.**

Не відома.

**Фармакологічні властивості.**

Препарат регулює рівень жіночих статевих гормонів, чинить метаболічну, седативну та протизапальну дію. Дія препарату базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

**Фармацевтичні характеристики.**

**Основні фізико-хімічні властивості:** прозорий безбарвний розчин без запаху.

**Несумісність.**

Невідома.

**Термін придатності.** 5 років.**Умови зберігання.**

Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C.

Зберігати у недоступному для дітей місці.

**Упаковка.**

5 ампул та 100 (5x20) ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

**Категорія відпуску.** За рецептром.**Виробник.**

Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ.

**Місцезнаходження.**

Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

**Дата останнього перегляду.**

Узгоджено з матеріалами  
регистраційного досьє та достовірно  
відомими даними щодо застосування  
лікарського засобу