

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
 здоров'я України
08.04.09 № 279
Реєстраційне посвідчення
№ УЛК /0794/Б/109

І Н С Т Р У К Ц І Я
для медичного застосування препарату
**ТЕСТИК КОМПОЗИТУМ
(TESTIS COMPOSITUM)**

Склад:

діючі речовини: 2,2 мл містять Testis suis D4 – 22 мкл, Embryo suis D8 – 22 мкл, Glandula suprarenalis suis D13 – 22 мкл, Kalium picrinicum D6 – 22 мкл, Panax ginseng D4 – 22 мкл, Damiana D8 – 22 мкл, Caladium seguinum D6 – 22 мкл, Cor suis D8 – 22 мкл, Cortisonum aceticum D13 – 22 мкл, Vitex agnus-castus D6 – 22 мкл, Selenium D10 – 22 мкл, Strychninum phosphoricum D6 – 22 мкл, Cantharis D8 – 22 мкл, Curare D8 – 22 мкл, Conium maculatum D28 – 22 мкл, Lycopodium clavatum D28 – 22 мкл, Phosphorus D8 – 22 мкл, Diencephalon suis D10 – 22 мкл, Magnesium phosphoricum D10 – 22 мкл, Ferrum phosphoricum D10 – 22 мкл, Manganum phosphoricum D8 – 22 мкл, Zincum metallicum D10 – 22 мкл, Acidum ascorbicum D6 – 22 мкл;

допоміжні речовини: натрію хлорид, вода для ін'єкцій.

Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій.

Фармакотерапевтична група. Комплексний гомеопатичний препарат.

Клінічні характеристики.

Показання. Недостатність функції чоловічих статевих залоз при імпотенції, простатиті, хронічному уретриті, доброкісній гіперплазії передміхурової залози, порушення обміну речовин, адипозогенітальній дистрофії, передчасному сім'явипорскуванні, нічному енурезі, прогресуючої м'язової дистрофії, виснаженні, хворобі Пейрона, остеомаляції, цукровому діабеті.

Протипоказання. Гіперчутливість до чужерідного тваринного протеїну.

Спосіб застосування та дози. Разова доза: дорослим і дітям віком від 12 років – 2,2 мл. Застосовувати разову дозу 2-3 рази на тиждень, при гострому стані – щоденно протягом 3-х днів, далі продовжувати, як звичайно, разову дозу 2-3 рази на тиждень у вигляді внутрішньом'язових, підшкірних, внутрішньовенених (струминно) ін'єкцій, а також внутрішньошкірних ін'єкцій в акупунктурні точки по 0,2 мл або перорально (розчинити разову дозу в 5-10 мл води та випити, затримуючи на кілька секунд у роті). Курс лікування – 3-6 тижнів.

Побічні реакції. У поодиноких випадках можуть виникати реакції гіперчутливості (або, навіть анафілактичні реакції) при внутрішньовенному введенні чужорідних протеїнів у концентрації, вищій за D10.

Передозування. Не спостерігалося.

Застосування в період вагітності або годування груддю. Препарат застосовується виключно для лікування чоловіків.

Діти. Не застосовувати препарат дітям віком до 12 років через недостатність належного задокументованого досвіду.

Особливі заходи безпеки. Відсутні.

Особливості застосування. Відсутні.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає на здатність керування автомобілем або під час роботи з складними механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Сумісний з іншими лікарськими засобами.

Фармакологічні властивості.

Фармакодинаміка. Препарат регулює функцію статевих залоз у чоловіків, чинить протизапальну, судинорозширувальну та метаболічну дію, що базується на активації захисних сил організму і нормалізації порушених функцій за рахунок речовин рослинного, мінерального та тваринного походження, які входять до складу препарату.

Фармакокінетика. Для гомеопатичних препаратів не визначається.

Фармацевтичні характеристики.

Основні фізико-хімічні властивості. Прозорий розчин без кольору і запаху.

Несумісність. Відсутня.

Термін придатності. 5 років.

Умови зберігання. Зберігати у зовнішній картонній коробці при температурі від 15 °C до 25 °C. Зберігати у недоступному для дітей місці.

Упаковка. 5 ампул та 100 (5x20) ампул по 2,2 мл у картонній коробці.

Категорія відпуску. За рецептром.

Виробник. Біологіше Хайліміттель Хеель ГмбХ.

Місце знаходження. Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Німеччина.

Дата останнього перегляду.